
รู้ไว้ ปลอดภัยจาก ไข้เลือดออก






สาเหตุ

ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี (Dengue) ที่มีพาหะคือยุงลาย ผู้ที่เคยป่วยแล้วสามารถเป็นซ้ำได้หากได้รับเชื้อต่างชนิดกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

อาการ

- มีไข้สูงลอย 39 – 40 องศา 2 – 7 วัน ปวดเมื่อยตามตัว
- คลื่นไส้อาเจียน
- มีผื่นตามตัว
- ช็อกจากภาวะเลือดข้น อาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไตวาย ตับอักเสบ
- เกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกง่าย อาเจียนเป็นเลือด







การรักษา

โรคไข้เลือดออกไม่มียาจำเพาะ ใช้วิธีรักษาตามอาการ



- กินยาลดไข้ (ใช้พาราเซตามอล ห้ามใช้แอสไพริน) และเช็ดตัว
- ดื่มน้ำให้เพียงพอ ในรายที่มีอาการขาดน้ำให้ดื่มน้ำเกลือแร่
- หากมีไข้เกิน 3 วัน และมีอาการช็อก ให้รีบนำส่ง รพ. โดยทันที





การป้องกัน

- ปกป้องร่างกาย ใช้ยาทากันยุง สวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด นอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวด





- จำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด ทำลายภาชนะไม่จำเป็นที่อาจมีน้ำขัง ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ พ่นสารเคมีตามแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

